

## POLINIZAÇÃO DO FEIJOEIRO (*Phaseolus vulgaris*) EFETUADA POR *Apis mellifera* L.<sup>(1)</sup>

AUGUSTA CAROLINA DE CAMARGO CARMELLO MORETI<sup>(2,4)</sup>, RONALDO MÁRIO BARBOSA DA SILVA<sup>(2)</sup>, ETELVINA CONCEIÇÃO ALMEIDA DA SILVA<sup>(2)</sup>, MARIA LUISA TELES MARQUES FLORÊNCIO ALVES<sup>(2)</sup> e ELIANA APARECIDA SCHAMMASS<sup>(3)</sup>

**RESUMO:** O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de verificar se a produção do cultivar Carioquinha IAC-80 de feijão, poderia ser aumentada pela polinização realizada pelas abelhas africanizadas (*Apis mellifera*) em condições ecológicas da região de Pindamonhangaba, São Paulo e identificar qual a melhor metodologia a ser utilizada em testes de polinização da cultura. Pode-se concluir que: 1-as abelhas só visitam as flores do feijoeiro quando obrigadas por estarem restritas a gaiolas de polinização ou por não existirem outras plantas florescendo no mesmo período, 2-as visitas de abelhas às flores não resultam em aumentos significativos na produção do cultivar em estudo e, 3- as gaiolas de polinização não são adequadas para serem usadas em testes que necessitam isolar plantas de feijoeiro.

**Termos para indexação:** *Phaseolus vulgaris*, polinização, *Apis mellifera*.

*Common bean (Phaseolus vulgaris) pollination by Apis mellifera L.*

**SUMMARY:** The present work was carried out at Pindamonhangaba county, State of São Paulo, with the objective of verifying if the production of the common bean, cultivar Carioquinha IAC-80 can be increased by Africanized bees (*Apis mellifera* L.) pollination. It has, also the aim of determining the best methodology to be used in pollination tests of common bean. It was concluded: 1- the honey bees only visit the common bean flowers when forced to it, either when they are confined by pollination cages or when they have no other flowers to visit in the same period, 2- the honey bee visits do not cause a significant increase in the common bean production and, 3- the pollination cages are not indicated for tests which need the bean plants be isolated.

**Index terms:** *Phaseolus vulgaris*, pollination, *Apis mellifera*.

- 
- (1) Projeto IZ 14-005/85. Recebido para publicação em dezembro de 1994.  
(2) Seção de Apicultura, Divisão de Zootecnia Diversificada.  
(3) Seção de Estatística e Técnica Experimental, Divisão de Técnica Básica e Auxiliar.  
(4) Bolsista do CNPq.

## INTRODUÇÃO

O feijão (*Phaseolus vulgaris*) é um importante componente da dieta alimentar de vários povos. No Brasil este produto assume uma importância especial, não só por ser nosso país o maior produtor mundial, mas também porque o feijão é uma das principais fontes protéicas de nosso povo (ROSTON, 1993).

O consumo per capita está em torno de 16kg/habitante/ano em média, sendo os grãos ricos em proteína vegetal (teor médio de 20-22%) e considerável fornecedor energético (341cal/100g)(BULISANI et al.,1986).

Embora considerado um alimento básico e de importância para a alimentação, o feijão não tem uma produção que acompanha sua demanda. O Brasil produziu nos últimos anos em torno de 2,2 a 2,5 milhões de toneladas de feijão em aproximadamente 5 milhões de hectares cultivados, tendo o Estado de São Paulo, contribuído com 350 a 400 mil toneladas (ROSTON, 1993).

A produtividade média é aproximadamente 500kg/ha, que é baixa quando comparada à dos Estados Unidos da América (cerca de 1.600kg/ha) ou a de plantios especializados no Estado de São Paulo (feijão de inverno irrigado) que é de 1.800kg/ha, em média (BULISANI et al.,1986).

As informações bibliográficas a respeito de sua polinização entomófila são escassas e controversas: Darwin(1858) citado por McGREGOR (1976) e PALMER(1969) observaram grandes aumentos de produção nas plantas visitadas por insetos, quando comparadas às testemunhas, enquanto Darwin(1876) citado por McGREGOR (1976), observou que quando comparou plantas cobertas com gaiolas teladas e plantas descobertas, ambas apresentaram a mesma produção.

Em outros estudos como o de FREE (1966), no entanto, foi observado um pequeno aumento de produção nas plantas visitadas por insetos.

FREE(1970) verificou que os insetos visitam as plantas de feijão efetuando a polinização cruzada, mas isso não resultou em aumentos de produção, o mesmo observado por Mommers (1971) citado por McGREGOR (1976) que, estudando a polinização em casas de vegetação, concluiu que a produção não é influenciada pelas abelhas.

Segundo TASEI (1984) o feijoeiro é planta autógama (autopolinizável e autocompatível) e, portanto, não precisa da ação de polinizadores. RAHMAN & PATIL

(1991) também afirmaram que as flores de *P. vulgaris* são regularmente visitadas por insetos que efetuam sua polinização cruzada, sem que isto aumente a produção da cultura.

McGREGOR(1976) concluiu que seriam necessários mais estudos a respeito da polinização de vários cultivares de feijão, para serem obtidos resultados mais confiáveis.

O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de verificar se a produção do feijoeiro, cultivar Carioquinha IAC-80, poderia ser aumentada pelas visitas de abelhas africanizadas (*Apis mellifera* L) em condições climáticas de Pindamonhangaba, SP e qual a metodologia mais adequada a ser utilizada em testes de polinização da cultura.

## MATERIAL E MÉTODOS

O presente experimento foi realizado, em três anos, em área do Centro de Apicultura Tropical, do Instituto de Zootecnia, em Pindamonhangaba, SP, utilizando o cultivar Carioquinha IAC-80 de feijoeiro.

Durante o florescimento, no primeiro ano, foram utilizados os seguintes tratamentos: áreas cobertas com gaiolas teladas (de 3m X 2m X 2m) contendo abelhas, áreas cobertas porém sem abelhas e áreas descobertas e livremente visitadas por insetos (testemunha).

Após a formação das vagens e sementes, as amostragens foram realizadas, nas nove covas centrais e na parcela toda, anotando-se os seguintes dados: número de sementes/vagem, peso de 100 sementes, peso do total de sementes e porcentagem de germinação das sementes.

As colméias utilizadas no primeiro ano continham enxames fortes e devido à alta concentração de população no interior das gaiolas teladas, houve grande mortalidade de abelhas, sendo estas atraídas pela luz, concentrando-se nos cantos superiores das gaiolas.

No segundo ano, o volume das áreas cobertas foi aumentado para 24 m<sup>3</sup> (3m X 4m X 2m), tendo as colmeias uma população média, sendo fornecida ainda uma fonte de água, com o objetivo de reduzir a mortalidade inicialmente observada.

No segundo ano, foram coletados dados do feijão da seca e das águas, registrando-se: os números de vagens/plantas, de sementes por planta e de sementes por vagem, e ainda os pesos de sementes/planta, de sementes/vagem e peso de 100 sementes.

No primeiro e segundo anos de observação o delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 3 tratamentos e 6 repetições.

No último ano de observação (terceiro), os dados foram coletados apenas na cultura da seca, sendo utilizados os seguintes tratamentos: áreas cobertas com gaiolas teladas de 3X2X2m (12m<sup>3</sup>) sem abelhas, áreas de 3X2 nas quais ensacaram-se 10 plantas com filó e áreas de 3X2 livremente visitadas por insetos (testemunha), nas quais foram etiquetadas 10 plantas. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três tratamentos e 20 repetições.

As amostragens foram realizadas nas 10 plantas marcadas em cada parcela, coletando-se os seguintes dados: os números de vagens por plantas, de sementes por planta e de sementes por vagem, bem como os pesos de sementes por planta, de sementes por vagem e de 100 sementes.

A comparação das médias de produção entre os tratamentos foi feita através do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando o quadro 1, que encerra os dados do primeiro ano de avaliação, pode-se constatar que não houve diferença significativa ( $P > 0,05$ ) entre as médias dos três tratamentos empregados, para as diversas variáveis estudadas, quando se avaliaram as 9 covas centrais, ou a parcela toda. Pode-se verificar, no entanto, que a média do peso total de sementes da parcela toda (quadro 1) foi numericamente maior (cerca de 40%) no tratamento que empregou gaiolas teladas contendo abelhas em seu interior, em relação aos demais tratamentos.

Quadro 1 - Número médio de sementes por vagem, peso médio de 100 sementes (g), peso médio do total de sementes (g) e da porcentagem de germinação, em cultura de feijoeiro, do cv Carioquinha IAC-80, em Pindamonhangaba, SP (1º ano de avaliação)

	Número de sementes/vag.		Peso de 100 sementes		Peso do total de sementes		Germinação %
	CC	PT	CC	PT	CC	PT	
			g				
Gaiola C/ abelhas	5,503a	5,286a	92,500a	90,000a	259,5a	809,8a	76a
Gaiola S/ abelhas	5,468a	5,228a	90,667a	88,333a	163,7a	576,2a	69a
Testemunha	5,022a	5,159a	85,667a	85,667a	257,7a	564,2a	67a
Média	5,331	5,224	89,056	88,000	226,9	650,1	70,50
C.V. %	7,62	6,65	6,99	4,81	36,25	29,72	7,99
dms	0,643	0,524	9,865	6,702	130,3	306,1	11,12

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferiram entre si pelo teste de Tukey ( $P < 0,05$ ).

CC= Covas centrais.  
PT= Parcela toda.

Constatou-se que algumas plantas presentes nas parcelas que foram cobertas com gaiolas teladas, apresentaram estiolamento, o que deve ter afetado sua produção. O estiolamento de plantas em experimentos deste tipo já havia sido observado por FREE & SPENCER-BOOTH (1963), em cultura de mostarda.

Neste primeiro ano, o número de visitas de abelhas às flores do feijoeiro foi muito reduzido, variando de 1 a 7 abelhas/m<sup>2</sup>, em 10 minutos de observação, com uma média de 2,67 abelhas/m<sup>2</sup>, no horário de maior visitação (11-12 horas), pois no mesmo período de florescimento do feijoeiro, havia um grande número de flores de *Eucalyptus* spp. abertas e sendo intensamente visitadas. Nas primeiras

horas da manhã, constatou-se, ainda, que as abelhas rotineiramente coletavam pólen nas flores da grama batatais (*Paspalum notatum*).

Nos quadros 2 e 3, podem ser observados os dados referentes ao segundo ano de avaliação. Verifica-se que não ocorreram diferenças significativas ( $P > 0,05$ ) entre as médias dos três tratamentos, para todas as variáveis avaliadas, nas duas épocas de plantio, o que discorda observações de Darwin (1858) citado por MCGREGOR (1976) e das de PALMER (1969) que, em experimento realizado na África do Sul, obteve produção 6 a 7 vezes mais alta em gaiolas contendo abelhas, do que em gaiolas excluindo-as.

